

COMO TOMAR EL MMS, MMS2 Y DMSO EN CASOS DE CANCER

**Recuerde que lo más importante es tomar
el MMS con disciplina y prudencia.**

[MMS CDMX]

¿CÓMO TOMAR EL MMS EN CASOS DE QUIMIOTERAPIA?

IMPORTANTE:

Siempre continúe el tratamiento prescrito por su médico y permanezca bajo su control. En caso de estar bajo tratamiento con Bicarbonato de Sodio, separe cuando menos 2 horas la toma de MMS del Bicarbonato.

No consumir MMS el día que se administra la quimioterapia y hasta 2 días después de terminada.

I. ¿Afecta el MMS a la quimioterapia?

La respuesta del investigador Andreas Kalcker a esta pregunta es la siguiente:

“Dispongo de informes en los que el MMS/CDS ayudó a los pacientes de quimioterapia a mitigar los severos efectos tóxicos secundarios.”

Agrega:

“El problema del cáncer es que, habitualmente, los enfermos no mueren como consecuencia del propio cáncer, sino por un fallo hepático-renal. Es decir, por un colapso del sistema de filtración de la sangre, debido a la producción de una cantidad excesiva de toxinas liberadas por el propio cáncer, y por los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Por decirlo de un modo simple, mueren por intoxicación. De ahí el efecto positivo del Dióxido de cloro, ya sea MMS o de CDS, porque ambos son capaces de limpiar al organismo de la acumulación de toxinas.”

II. ¿Cómo contribuye el MMS a la solución del problema?

La teoría del efecto del MMS (Dióxido de Cloro) sobre el cáncer es la siguiente:

- a) Una vez dentro de las células, el Dióxido de Cloro eliminará los virus, hongos y microbios que podrían estimular la alteración del metabolismo de las células y la propagación del cáncer. Limpiando las células cancerosas estas pueden revertirse más fácilmente en células normales.
- b) También, el Dióxido de Cloro funciona como un activador electroquímico de las mitocondrias. Si la célula tiene cáncer, al reactivar sus mitocondrias “apagadas” se altera su metabolismo y se induce la apoptosis (destrucción) desde su interior.
- c) El MMS refuerza la función del sistema inmunológico que se encuentra comprometido por la quimioterapia, ya que mata los patógenos y elimina las toxinas que viajan por el torrente sanguíneo y que pueden provocar varios tipos de infecciones y complicaciones.

III. ¿Cómo tomar MMS para lograr buenos resultados?

PROTOCOLO 1000:

A continuación se muestra un EJEMPLO de cómo iniciar el protocolo 1000 durante la quimioterapia. Recuerde tomar el MMS sólo 4 días por semana (Descansar el día que se administra la quimioterapia y 2 días después de terminada).

Tabla 1. Dosificación gradual (Acompañar cada toma con 100ml de agua)									
Día\Hora	11:00	13:00	14:00	15:00	17:00	18:00	19:00	Al dormir	Total*
Día 1	1	-	1	-	1	-	1	-	4
Día 2	1	1	-	1	-	1	-	1	5
Día 3	1	1	-	1	1	-	1	1	6
Día 4	1	1	1	1	1	-	1	1	7
Día 5	Quimioterapia								
Día 6	Descanso								
Día 7	Descanso								
Día 8	1	1	1	1	1	-	1	1	7
Día 9	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Día 10	1	1	1	1	1	1	1	2	9
Día 11	2	1	1	1	1	1	1	2	10
Día 12	Quimioterapia								
Día 13	Descanso								
Día 14	Descanso								
Día 15	2	1	1	1	1	1	1	2	10
Día 16	2	1	1	1	2	1	1	2	11
Día 17	2	1	2	1	2	1	1	2	12
Día 18	2	1	2	1	2	1	2	2	13
Día 12	Quimioterapia								
Día 13	Descanso								
Día 14	Descanso								
Día 15	2	1	2	1	2	1	2	2	13
Día 16	2	2	2	1	2	1	2	2	14
Día 17	2	2	2	2	2	1	2	2	15
Día 18	2	2	2	2	2	1	2	2	16
Día 19	Quimioterapia								
Día 20	Descanso								
Día 21	Descanso								

*Por comodidad puede usar el **Protocolo Botella**: Preparar en una botella todas las gotas de MMS que tomara durante un día y tomar un trago en la hora indicada.

PUNTOS IMPORTANTES:

- Continúe el patrón de la **Tabla 1** subiendo 1 gota cada día hasta que sienta molestias como náuseas o dolor de cabeza. En ese punto se encuentra su tolerancia actual y deberá regresar y mantener la dosis anterior por un par de días antes de intentar subir nuevamente su dosis.
- En los casos de cáncer la cantidad ingerida de MMS es determinante para poder combatirlo. En este sentido:
 - a) Es mejor tomar varias dosis pequeñas que pocas dosis concentradas.
 - b) Propóngase tomar la mayor cantidad de MMS que pueda diariamente sin llegar a sentirse peor por los efectos depurativos que provoca
 - c) **El tratamiento estándar para cáncer consiste en tomar 3 gotas activadas de MMS cada hora durante 10 veces al día (30 gotas al día). Esta cantidad es una meta deseable pero no obligatoria, no todas las personas tienen igual tolerancia al MMS, así que si su dosis diaria es superior a 18 gotas su tratamiento será correcto.**
- Si a largo plazo nota que tomar MMS le ocasiona diarrea (a corto plazo puede provocar diarrea pero por motivos diferentes: Expulsión de patógenos) usted puede haber desarrollado un cuadro de acidosis intestinal; descanse de tomar MMS por 15 días o déjelo para otras aplicaciones y cambie a CDS.
- Finalizado el tratamiento (Hasta recuperarse de la enfermedad) debe tomar una dosis de “mantenimiento” que consiste en tomar de 6 gotas diarias durante la mitad del tiempo que haya tomado el Protocolo 1000.

¿CÓMO SUMINISTRAR EL MMS-2 EN CASOS DE QUIMIOTERAPIA?

IMPORTANTE:

Combinar el MMS con el MMS-2 es un método muy eficaz para combatir el cáncer, sin embargo, durante la quimioterapia requiere de una administración prudente ya que al acelerar la muerte de patógenos y la expulsión de toxinas, también puede aumentar la posibilidad de experimentar “crisis depurativas” (náuseas, dolor de cabeza, diarrea).

La forma estándar de combinar el MMS2 con el MMS es tomar la primera capsula hasta 5 días después de haber iniciado el tratamiento con el MMS y aumentar una capsula por día hasta llegar a tomar 5 capsulas diarias, una cada 2 horas.

Para el caso del EJEMPLO anterior la forma de tomar el MMS-2 sería la siguiente:

Tabla 2. Dosificación MMS-2 (Acompañar cada capsula con 250 ml de agua)									
Día\Hora	11:00	13:00	14:00	15:00	17:00	18:00	19:00	Al dormir	Total*
Día 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Día 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Día 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Día 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Día 5	Quimioterapia								
Día 6	Descanso								
Día 7	Descanso								
Día 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Día 9	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Día 10	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Día 11	-	1	-	-	-	-	1		2
Día 12	Quimioterapia								
Día 13	Descanso								
Día 14	Descanso								
Día 15	-	1	-	-	-	-	1	-	2
Día 16	-	1	-	-	1	-	1	-	3
Día 17	-	1	-	-	1	-	1	-	3
Día 18	1	-	1	-	1	-	1	-	4
Día 12	Quimioterapia								
Día 13	Descanso								
Día 14	Descanso								
Día 15	1	-	1	-	1	-	1	-	4
Día 16	1	1	-	1	1	-	1	-	5
Día 17	1	1	-	1	1	-	1	-	5
Día 18	1	1	-	1	1	-	1	-	5
Día 19	Quimioterapia								
Día 20	Descanso								
Día 21	Descanso								

I. PUNTOS IMPORTANTES

- Repita el Día 18 (5 capsulas al día) hasta terminar el tratamiento (30 días).
- Observe las reacción depurativa de su cuerpo, si presenta molestias tome 1 capsula menos y espere un par de días antes de volver a subir el número de capsulas que toma al día. **Tome máximo 5 capsulas al día.**

- Si tomar 5 capsulas al día le ocasiona malestar, puede tomar solo 4 capsulas al día, su tratamiento seguirá siendo correcto.
- Puede tomar sin ningún problema las capsulas de MMS-2 con el agua en la que ha preparado el MMS.
- **Tome el MMS-2 con un vaso completo de agua (mínimo 200 ml).**
- **NO tome las capsulas con refresco, lo mejor es agua simple.**
- No tome el MMS-2 en ayunas.

¿CÓMO SUMINISTRAR EL DMSO EN CASOS DE QUIMIOTERAPIA?

IMPORTANTE:

Siempre realizar la prueba de alergia al DMSO antes de su uso.

El DMSO consumido oralmente mejora la absorción tanto del MMS como de la quimioterapia, y en consecuencia potencia sus efectos. Debe tenerse en cuenta que si se toma durante la quimioterapia, aunque beneficioso, aumenta la posibilidad de experimentar molestias por efecto de los mismos fármacos. Así mismo, si se toma combinado con el MMS, al incrementar su efecto desintoxicante, puede aumentar las molestias del tipo depurativas.

I. Uso combinado del DMSO con el MMS en periodo de quimioterapia.

Puede agregar el DMSO al MMS desde el primer día del tratamiento

El DMSO debe agregarse siempre en la misma cantidad de gotas que se hayan usado para preparar el MMS. Esto es, si en un vaso se activa 1 gota de MMS deberá agregar 1 gota de DMSO al 70%, si activa 2 gotas de MMS, deberá agregar 2 gotas de DMSO y si activa 3 gotas, deberán agregar 3 de DMSO.

Para cualquier cantidad de gotas, el procedimiento es el siguiente:

1. Utilice solo vasos de vidrio para mezclar el MMS y el DMSO.
2. Active las gotas de MMS que vaya a tomar.
3. Espere 30 a 45 segundos para completar la activación del MMS.
4. Añada al vaso tantas gotas de DMSO como gotas de MMS haya activado.
5. Espere 3 minutos para que el DMSO “absorba” al MMS.
6. Añada 100 ml de agua y beba inmediatamente. **Este protocolo no admite que la mezcla del MMS y el DMSO se almacene por mucho tiempo, después de 20 minutos el DMSO neutraliza al MMS.**

II. PROTOCOLO 3000

Se utiliza para administrar el MMS a través de la piel para que llegue más rápido al torrente sanguíneo o para que penetre directamente en la zona afectada.

IMPORTANTE: Cuando se utiliza DMSO tópicamente la piel debe estar limpia y seca. La cara y nuca son más sensibles al DMSO y allí no deberían aplicarse concentraciones mayores al 50%.

PROCEDIMIENTO

1. Activar 15 gotas de MMS en un vaso de vidrio, esperar 30 segundos y añadirle 15 gotas de DMSO al 70%. Esperar 3 minutos para que el DMSO “encapsule” al MMS. Puede 5 o 10 gotas de agua, esto depende de la sensibilidad de la piel de cada persona al DMSO.
2. **No utilice guantes de ningún tipo. Simplemente use sus manos para aplicar la mezcla. Se deben de tener las manos perfectamente limpias, de lo contrario utilice una bolsa de plástico a modo de guante.**
3. Esta mezcla deberá extenderse en el brazo, la pierna o en la zona afectada. Si sintiera ardor, siga frotando hasta que no quemé. Si quemara demasiado, puede rebajar la mezcla del MMS con el DMSO agregando 10 gotas agua.
4. Deje que se absorba por 1 o 2 minutos. Después de que se absorba enjuague con agua o aplique aceite o ungüento en la zona.
5. **Para aplicación general:** Cada aplicación se hará en una parte distinta del cuerpo: Primero un brazo, luego el otro, luego una pierna y luego la otra.
 - El primer día realizar 3 aplicaciones cada 3 horas.
 - El segundo y tercer día aplicar una vez cada hora.
 - Descansar el cuarto día.
 - Repetir de nuevo el ciclo aplicando DMSO cada hora pero ahora durante 4 días seguidos.
6. **Para aplicación focalizada:** Aplique la mezcla sobre heridas y llagas y en caso de ser un cáncer avanzado la recomendación es que se haga la aplicación tópica lo más cerca al área afectada cada 4 horas, de tres a cuatro veces durante todo el día.

III. ¿Cómo acompañar su tratamiento con el Protocolo Botella?

Prepare el MMS en una botella como lo haría normalmente en el Protocolo 1000. Lo único que hay que tener en cuenta es que el DMSO debe añadirse justo antes de tomarse cada dosis, es decir, primero deberá verter en un vaso la dosis que le corresponda de la botella, y cuando esté en el vaso es cuando deberá añadir el DMSO, esperar 3 minutos y luego tomarlo.

DUCHA VAGINAL PARA CASOS DE CÁNCER

Protocolo para higiene femenina

- Este protocolo ha sido todo un éxito para las mujeres. Ayuda a eliminar infecciones, quistes de ovario, miomas de útero, endometriosis, enfermedades de transmisión sexual, herpes, cistitis y fibromialgia. Es muy efectivo para el cáncer en dicha zona y para cualquier tipo de cáncer, **especialmente cáncer de seno**, pues se absorbe por el cuello uterino y llega directamente al sistema linfático, atacando las células cancerígenas.
- Activar de 10 a 15 gotas de MMS en 500 ml de agua. Hacer baños vaginales con un irrigador o con una pera de 250 cc.
- Retener el líquido en la vagina por un espacio de 10 minutos
- Para todas las mujeres es recomendable realizarse dos enemas al mes, en especial luego de la menstruación. Para enfermedades en esta zona repita el lavado cada tercer día. En casos de canceres en esta zona o en las mamas se debe incrementar este protocolo a una frecuencia diaria.

